

Desinfección de Morbern Tejidos recubiertos

Desinfección general

Lejía

Diluir la lejía a una proporción de 9:1 (10%). Aplique generosamente una solución de lejía diluida con una esponja. Enjuague con agua fría varias veces. Secar. Asegúrese de seguir las pautas en la etiqueta del fabricante.

Alcohol isopropílico

El alcohol isopropílico con una concentración de alrededor del 70% puede matar los coronavirus. Deje la solución de alcohol isopropílico al 70% durante un minuto. Siga esto con varios enjuagues con agua limpia antes de secar.

Peróxido de Hidrógeno

Se puede aplicar Peróxido de Hidrógeno al 3% de concentración. Se puede aplicar peróxido de hidrógeno con una concentración del 3% al producto y dejar reposar durante un minuto. Siga esto con varios enjuagues con agua limpia antes de secar.

Para el uso de limpiadores desinfectantes específicos para el cuidado de la salud, consulte la Guía para el cuidado de la salud de Morbern.

Tenga en cuenta que estos desinfectantes no son limpiadores de manchas o suciedad, que ayudan a combatir las bacterias persistentes y los virus patógenos.

Siempre es mejor practicar primero en un área discreta para asegurarse de que no afecte negativamente a la tela recubierta. Desde allí puede expandirse al área que necesita desinfectar. Este documento no contiene consejos médicos.

Este documento no contiene consejos médicos. La información se proporciona de buena fe solo con fines informativos y educativos generales y no reemplaza el asesoramiento profesional. No hacemos ninguna representación ni garantía de ningún tipo, expresa o implícita, con respecto a la precisión, adecuación, validez, confiabilidad, disponibilidad o integridad de cualquier información en este documento.

Bajo ninguna circunstancia Morbern aceptará cualquier responsabilidad por cualquier pérdida o daño de cualquier tipo incurrido como resultado del uso de la información en este documento.

Siga las instrucciones del fabricante.

Para obtener más información, recomendamos visitar Desinfección de entornos en sanitarios y no sanitarios potencialmente contaminados con SARS-CoV-2 según la lista del Centro Europeo para la Prevención y el Control de Enfermedades.

